



Pour répondre à ta question concernant l'utilisation de Profil'Oak. Il peut s'utiliser à plusieurs étapes :

Profil'Oak kullanım ile ilgili açıklama : çeşitli etaplarda kullanılabilir :

- En vinification en rouge pour protéger vis-à-vis des oxydations et renforcer la couleur à une dose de 5 à 10 g/HL en fonction de la qualité de la vendange.
- **Şaraba dönüşümü sırasında kırmızılardan oksidasyondan koruma ve hasat kalitesi bakımından rengi kuvvetlendirmek için (5 veya 10 g/HL arası dozaj ile) kullanılabilir.**

- En élevage après fermentation malolactique à raison de 2-8 g/hl, pareil en fonction du vin (il convient de faire des tests) pour renforcer la structure et stabiliser la couleur.
- **Malolaktik fermantasyon döneminden sonra (2-8 g/HL) kullanılabilir, fakat bu dönemde şarapta testler yapılarak şarabın yapısını kuvvetlendirmek ve rengi stabilize etmek için kullanılabilir.**

- Eventuellement sur blanc juste avant mise en bouteille (0,5 à 1g/hl) pour rendre un nez plus net sans odeur de réduit, protéger de l'oxydation et obtenir une meilleure tenue au vieillissement.

- **Beyaz türlerde kullanım ancak şişeleme safhasından hemen önce (0,5 – 1 g /hl) olarak yapılmalıdır.**

- **Aynı zamanda oksidasyondan koruyacaktır ve de aromaları daha ön plana çıkararak şarabı şişede bekletme döneminde koruma sağlayacaktır.**



Attention tous les dosages sont en g/HL (100 litres) !

DİKKAT bütün dozajlar g/HL(100 litre) olarak hesaplanmalıdır. !